

## **MATRIZ ÍNDICE ROSSER (ROSSER INDEX MATRIX (RIM))**

Rosser RM, Watts VC - 1972\*

Esta escala utiliza dos dimensiones, discapacidad y angustia (*distress*), que combinadas dan 29 posibles estados de salud, cada uno con una puntuación numérica para la calidad de vida. Los datos pueden ser recogidos directamente por la entrevista clínica.

La Matriz Índice Rosser asigna puntuaciones desde -1,486 hasta 1,000 en QALYs. Una puntuación de 1,000 indica completa normalidad, y la muerte es dada por la puntuación 0,000. Las puntuaciones negativas indican estados de salud pensados como peores que la muerte<sup>†</sup>.

---

\* Rosser RM, Watts VC. The measurement of hospital output. *Int J Epidemiol*, 1972; 1: 361-8

† Gudex C, Kind P. The QALY Toolkit. Discussion paper 38. Centre for Health Economics. United Kingdom, University of York, 1987.

Discapacidad	Angustia (distress)			
	Ausente	Leve	Moderada	Severa
I. No discapacidad.	1,000	0,995	0,990	0,967
II. Leve discapacidad social.	0,990	0,986	0,973	0,932
III. Discapacidad social severa y/o leve deficiencia en la actuación laboral.	0,980	0,972	0,956	0,912
IV. Elección de trabajo o actuación en el trabajo severamente limitada. Amas de casa y ancianos capaces de hacer solamente trabajo doméstico ligero, pero incapaces para ir de compras.	0,964	0,956	0,942	0,870
V. Incapaz de acometer algún empleo remunerado. Incapaz de continuar cualquier educación. Ancianos confinados en casa excepto para cortos paseos acompañados e incapaces de hacer ninguna compra.	0,946	0,935	0,900	0,700
VI. Confinados a una silla o silla de ruedas o capaces de moverse alrededor en la casa solamente con la ayuda de alguna asistencia.	0,875	0,845	0,680	0,000
VII. Confinado a la cama.	0,677	0,564	0,000	-1,486
VIII. Inconsciente.	-1,028	*	*	*